

Ma'murjon XOLMIRZAEV,

O'zbekiston Milliy universiteti katta o'qituvchisi, g.-m.f.d.(PhD)

E-mail: mamur@mail.ru.

Tel:(99)0055728

Norbek BEGALIEV,

O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi,

E-mail:begaliyevnorbek2@gmail.com

Tel:(90)1311117

Fatima MIRFAYZIYEVA,

O'zbekiston Milliy universiteti stajyor o'qituvchisi,

E-mail:fatiminamirfayziyeva@gmail.com

Tel:(97)2685458

ToshDTU. g.-m.f.d.(PhD) dotsent v.b., D.Q.Begimkulov taqrizi asosida.

CHIRCHIK INDUSTRIAL ZONE DEPENDENCE OF THE DEGREE OF MIGRATION OF POLLUTING ELEMENTS IN THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT ON NATURAL AND MAN-MADE FACTORS

Annotation

Industrial development not only leads to economic growth of the country, but also affects the geo-ecological situation. Based on this point of view, it should be studied and assessed in order to identify natural and man-made impacts and develop measures to prevent their negative consequences. This article is dedicated to exactly that.

Key words: technogenic factors, bush and single water intake structure, residential area, natural zone, aeration zone, industrial zone, urban planning plant, engineering and economic impact, mineral deposits, upper rocks, ecological and hydrogeological condition, region.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ЧИРЧИК ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ МИГРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ОТ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Аннотация

Промышленное развитие не только приводит к экономическому росту страны, но и влияет на геоэкологическую ситуацию. Исходя из этой точки зрения, его следует исследовать и оценивать с целью выявления природных и техногенных воздействий и разработки мер по предотвращению их негативных последствий. Эта статья посвящена именно этому.

Ключевые слова: техногенные факторы, куст и единое водозаборное сооружение, жилая территория, природная зона, зона аэрации, промышленная зона, градостроительный комбинат, инженерно-экономическое воздействие, месторождения полезных ископаемых, верхние горные породы, эколого-гидрологическое состояние, область.

CHIRCHIQ SANOAT ZONASI GEOLOGIK MUHITDA IFLOSLANUVCHI ELEMENTLARNING MIGRATSIYA DARAJASINING TABIIY VA TEXNOGEN OMILLARGA BOG'LQLIGI

Annotatsiya

Sanoat rivojlanishi hududlar mamlakatni iqtisodiy yuksalishiga olib kelish bilan bir qatorda, geoekologik holatga ham o'z tasirini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib tabiiy va texnogen bosimlarni aniqlash va salbiy tasirining oldini olish choratadbirlarini ishlab chiqish maqsadida uni tadtqiq qilish va baholash lozim. Ushbu maqola aynan shu mazmunni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: texnogen omillar, kust va yakka suv yeg'ish inshooti, yashash uchun moyil hudud, tabiiy, aeratsiya zonasasi, sanoat zonasasi, shahar-qurilish sanoat majmuasi, injener-xo'jalik ta'sir, foydali qazilma konlari ustki tog' jinslari, hududning ekologogidrogeologik holati.

Kirish. Rivojlangan sanoat hududlarida ekologiyaning turli xil ifloslanish sabablarini aniqlash geologik muhitiga ifloslanuvchi moddalarining salbiy ta'sir etish omillarini o'rganish, hamda tahlil qilish orqali ularning oldini olish masalasini tadtqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Geologik muhitni, aniqrog'i aeratsiya zonasasi orqali yer osti suvlarining ifloslanishini bashoratlash, ifloslantiruvchi unsurlarini xarakatini o'rganish, ularni tasniflash bo'yicha ko'plab tadtqiqotlar o'tqazib kelinmoqda. Bu borada olib borilayotgan tadtqiqotlarning nazariy, uslubiy va texnologik asoslarini ishlab chiqish inson salomatligi uchun xavfli bo'lgan muammolarni bartaraf qilish barobarida kelajak avlod genafondiga ta'sir etuvchi geoekologik xavfni oldini olishda muhim rol o'yinaydi. Jahon miyoysida yer osti suvlarining ifloslanish jarayonini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish masalalari ustuv yo'nalishlardan bo'lib, bu borada, suvdan foydalishni tartibga solish, ifloslantiruvchi manbaalarini aniqlash usullarini ishlab chiqish, ifloslanish darajasini o'rganish hamda baholash tizimini takomillashtirish, geoekologik xavfni bartaraf etish texnologiyalarini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, davlat mustaqilligining o'ttiz bir yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagি nutqida 2026 yilgacha eng avvalo e'tibor qaratiladigan 5 ta asosiy sohaga alohida to'xtalib, soxa oldida turgan vazifalarni bayon qildi. Shuningdek, joriy yilning 7 dekabr kuni, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, muammoli hududlarga toza ichimlik suvini yetkazish, ichimlik suvi sifatini yaxshilash borasida alohida dasturlar amalga oshirilish to'g'risidagi ma'ruzasi hamda yer osti suv resurslarini muhofaza qilish, ulardan oqilona foydalishni tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolashi yuqorida fikrimiz dalilidir.

Hududlarda asosiy ichimlik suvi manbai bo'lgan yer osti suvlarini inson salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi zararli moddalar bilan ifloslanish jarayonlari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqdaki, fanning oldiga qo'yilgan asosiy maqsadi, muammolarning yechimini topish, yer osti suvlarini ifloslanishdan muhofaza qilish, o'z vaqtida ifloslanish o'choqlarini aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun tizimli imkoniyatlar yaratishdan iborat. Mazkur faoliyatga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjalarda belgilangan inson salomatligini saqlash borasidagi vazifalarini bajarishda olib borilayotgan islohotlarni ijrosini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Zero hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi aholiga farovon hayot tarzini ta'minlashdan iborat.


Maqvuga oid adabiyotlar. Lavrik V.I., Rogal I.V., Yakovlenko P.I.lar ushbu masalada jahon tajribalarini tahlil qilinganda, Rossiya Fanlar Akademiyasi suv muammolari instituti olimlari tomonidan atrof-muhit ifloslanishining xavfliligi darajasi, geologik muhitga bo‘ladigan umumiy texnogen ta’sirning intensivligi bilan bog‘liqligini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilgan. Unda tog‘-kon, qishloq xo‘jalik va sanoatning boshqa ishlab chiqarish yaxshi rivojlangan Tula viloyati misoldida atrof muhitga bo‘layotgan umumiy texnogen ta’sirning baholash tamoyillari atrof muhit va yer osti suvlarini ifloslanishiga nuqtaviy texnogen manbaalarning (sanoat korxonalari, shaxtalar, elektrostansiya va boshqalar) xavfliligi qayd etilgan va baholangan [13]. Texnogen manbaalarning xavfliligini baholash uchun ishlab chiqilgan reyting bo‘yicha bir qator shahar va aholi yashash punktlarida texnogen ta’sirning atrof muhitga ko‘rsatayotgan ifloslanish darajasi tahlil kilinib turli uslublar bilan tadqiqot qilinganligini o‘rganilgan.

N.M.Rasskazov tomonidan, Katun daryosi havzasidagi (Oltoy tog'li hudud) yer osti suvlari tarkibidagi kimyoyiv elementlar holati bo'yicha tavsifi berilgan, Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{2+} , Pb^{2+} , Su^{2+} , Zn^{2+} makro va mikroelementlar migrasiyasining asosiy shakllari aniqlangan [3]. Statistik hisob-kitoblar amalga oshirildi va ularning maqsadi texnogen ta'siridagi murakkab shakllanish jarayonlarini modellahtirish natijalarini tasdiqlash edi. Ca, Na, K, Mg, Fe, Cl va F komponentlari asosan ion shaklida migrasion harakat kuzatiladi. Texnogen ta'siridagi murakkab shakllanish jarayonlanish umumiy hisobda 95-99% ni tashkil etadi. Ko'p jihatdan inson faoliyati tabiiy muhitga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ulardan eng muhimi asrlar davomida ko'rib chiqilayotgan hududda amalda bo'lgan va so'nggi o'n yilliklarda faol bo'lgan ekin maydonlarini sun'iy ravishda sug'orishdir [2].

Tadqiqot metodologiyasi. Ko‘p yillar davomida olib borilgan kuzatuv va taxllilar shuni ko‘rsatadiki sanoat hududida suffozion jarayonlarni rivojlanishi (cho‘kish, zahlash va b.) Bo‘zuv va Qorasuv kanallari bo‘ylab botqoqlanish, drenajlarning ta’siri, yangi o‘tgan ariqlarning qirg‘oqlari bo‘ylab yemirilishi, yerning ko‘chishi va suvgaga bo‘kish hodisalarini kuzatiladi. Bunday hodisalarning asosiy sabablari soz tuproqli jinslarning fizik xususiyatlari va sug‘orilishga yo‘naltirilgan suvning nazoratsiz oqishi bilan namligi oshgan soz tuproqli jinslar o‘z tuzilishini yo‘qtadi. Natijada suv omborlari va sug‘orish uchun yo‘naltirilgan suvlar ta’sirida yoriqlar hosil bo‘lib, ularning namligi oshishi tufayli geologik jarayon sodir bo‘ladi. Suvning sizib o‘tishi natijasida tuproq tarkibidagi tuzlarni eritadi va tuproqning kichik zarrachalarini ariqlarga olib ketadi (mexanik va kimyoviy migratsiya), (1-rasm). Suvga qisqa muddatli ta’sir qilish bilan diametri 0,3-0,5 dan 1,0 m gacha bo‘lgan chuhurchalar hosil bo‘ladi va uzoq muddatli ta’sir qilish natijasida ularning diametri 1,5 dan 3,0 m gacha yetadi[7]. Shunga ko‘ra, ariqlarning yon tomonlaridagi yoriqlar 0,1-0,3 dan 0,7-1,0 m gacha kenglikka ega. Ushbu ma‘lumotlar asosida hulosa qilish mumkunki, Bo‘zuv kanaliga quyiladigan soy vodiylari bo‘ylab hududda botqoqlanish jarayoni kuzatiladi. Bu esa yuqori to‘rtlamchi davr yotqiziqlari bilan chegaralangan va yer osti suvlaringining taqsimlanishini nazoratsiz qoldirish bilan bog‘liq holatdir. Tog‘ jinsining surilish hodisalarini kelib chiqish joylari Bo‘zuv, Zax kanallari, Qorasuv ariq bo‘ylarida, zovurlarda hamda kichik suv oqisiga mo‘ljallangan ariqlarda ko‘zga tashlanadi. Ushbu hodisaning sababi kanallar va ariqlar qirg‘oqlarining erroziyasi natijasida kanallar qirg‘oqlari bo‘ylab qulagan, tog‘ jinslarning muvozanati o‘zgargan va kengligi 0,5-1,0 dan 2,5-3 gacha, uzunligi 2-3 dan 5-7 m gacha bo‘lgan hajmga ega [12]. Chirchiq sanoat hududida iqtisodning turli tarmoqlari korxonalarini rivojlanganligi, o‘z navbatida tabiiy muhitga bo‘ladigan texnogen ta’sirning yuqoriligini ko‘rsatadi (1-rasm). Sanoat hududida ifloslantiruvchi unsurlaring migratsion darajasiga ta’sir etuvchi texnogen tomillarning masumiy, hududiyligi, chiziqli va mahalliy (lokal) turlari mayjud bo‘lib, manbalarni geologik muhitga ta’sirning o‘ziga xosligi, bir xil tarqalmaganligi, ta’sir doirasining turli xilligi, bundan tashqari, ta’sir etuvchi omillarning o‘ziga xos xususiyati bilan farqlanadi [12].

Janubiy-sharqiy sanoat hududining ekologo-gidrogeologik qirqimi. (Chirchiq)

1-rasm



1-jadval

Konservativ unsurlarning yer osti suvlarida migratsiya darajasi

Kuzatuv nuqtalari	Iflos- antirish manbasidan uzoqligi,m	Konservativ komponentlар konsentrasiyasi, mg/l	β	Molibden konsentrasiyasi, mg/l.		Barqarorlik darajasi α
				hisoblangan	fakt	
1	2	3	4	5	6	7
Ifloslanish manbaasi	-	17000	-	-	4,6	-
GXK 15	575	8000	0,47	2,16	0,08	0,037
480 quduq	2460	1216	0,07	0,32	0,024	0,075
25e quduq	7875	101	0,006	0,069	0,015	0,22

Hudud doirasida avvalgi «Kaprolaktam» ishlab chiqarish korxonasi maydonida qattiqligi yuqori bo'lgan 7,5 dan 7,8 mg-ekvl yoki 0,5 ruxsat etilgan me'yor va undan yuqori bo'lgan yer osti suvlarini mavjud. Azotli birikmalar (nitratlar va nitritlar) va

kaprolaktam tarkibidagi o'zgarishlarni «Maksam-Chirchiq» va «Kaprolaktam» korxonalari hududlarida maxsus qazilgan (GKK-II) kuzatuv quduqlari va undan past (gkk-xx) kuzatuv quduqlarida kuzatiladi.

Ma'lumotlarga ko'ra, hududdagi barcha kuzatuv nuqtalarda qattiq qoldiqlardan tashqari, yer osti suvlari tarkibidagi komponentlarni bir necha bor o'sishi kuzatilishi mumkin. Sanoat hududidagi bir necha suvni kuzatish nuqtalarida yer osti suvlarda neft mahsulotlarining miqdori ruxsat etilgan me'yorga deyarli yaqinlashib qolgan. Yer osti suv tarkibida mavjud metalloidlardan ruxsat etilgan me'yorga qisman yaqin bo'lgan quyidagi elementlar qayd etilgan: alyuminiy (Al), kobalt (Cd), svines (Pb), marganes (Mn). Neft mahsulotlari esa avvalgi yillarga nisbatan birmuncha me'yordan kamayganligi kuzatiladi[6]. Ifloslanish jaroyonidagi ushbu migrations harakat bиринчи texnogen ta'sirli hududda hosil bo'лади va keyingi texnogen hududlarda rivojlanib boradi, shuningdek, aerasiya zonasasi qatlamlarida litologik qatlamlarning o'tkazuvchanlik xususiyatiga bog'liq. Tabiiy sharoitda, texnogen ob'ektlardan mutazam iflosantiruvchi moddalarining migrations harakati natijasida litologiya qatlamida ikkilamchi ifloslanish manbai hosil bo'lishi kuzatiladi[12]. Suvning mineralogik turi gidrokarbonat-sulfatkalsiy-magniyidan sulfat-gidrokarbonat-kalsiy-natriygacha o'zgarib turadi. Suv tarkibida qattiq qoldiq 0,26 dan 0,44 g/l gacha va 3,1 dan 5,4 mg/ekv.gacha. Yillar davomida qilingan tahlil shuni ko'rsatadiki, (1990-2020yy) suvning qattiqligi tarkibida 2,0 va 1,5 baravar kamayishi kuzatiladi. Neft mahsulotlari, metalloidlarning miqdoran kamayganligi ya'ni, ularning sifat holatini yaxshilash tendensiyasi mayjudligi kuzatiladi. Suv tarkibida nitratlar miqdori 0,85 ruxsat etilgan me'yordan 0,48 gacha deyarli 2 martaga kamayganligi, suvdagi neft mahsulotlarining tarkibi atigi 0,1 ruxsat etilgan me'yorgacha sifat darajasi oshganligi kuzatiladi. Hudud aerasiya zonasining litologik qatlaming suvli qatlam himoyalish darajasiga ko'ra o'rtacha himoyalangan hisoblanadi[8]. Litologik tuzilishi soztaproq, gil tuproq, qum hamda mayda zarrali qumli jinslardan iborat. Suvli qatlami yuqori filtrlash xususiyatiga ega bo'lgan allyuvial yotqiziqlarining shag'al, shag'al-tosh qatlamlaridan tashkil topgan litologik qatlamliligi bilan tavsiflanadi. Chirchiq sanoat korxonalari doirasidagi texnogen ta'sirli hududlar, yer osti suvlaringifloslanish jarayonini shakllantirish va rivojlanirish shartlarining asosiy xususiyatlari hisoblanadi.

Taxlil va natijalar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki sanoat hududlarida yer osti suvlaring chiqurligi, oqim yo'nalishi, tezligi tarkibidagi rejimining o'zgarishini baholashga va iflosantiruvchi moddalar miqdori, turi va iflosantiruvchi manbalariga qarab quyidagicha ajratish imkonimi beradi:

- kimyoiviy («Makasm-Chirchiq», «Chirchiqtekstil», «Kaprolaktam»);
- energetika (Transformator zavodi, Chirchiq, Oqqovoq, Qishloq xo'jalik elektr qurilish kombinati, Aranchi GES stansiyalari);
- qurilish materiallari ishlab chiqarish (Chirchiq qurilish materiallari va g'isht zavodi);
- tog'-kon («Yumaloq» shag'al saralash zavodi va karieri, «Chirchiq tajribaviy asfalt-beton» MChJ zavodi, «Yumaloq» inert materiallar kerari);
- rangli metallurgiya («O'zQMMMK», «Yumaloq» metalni qayta ishslash zavodi);
- mashinasozlik sanoati («Chirchiqselmash», «O'zbekkimmash», «Avtoservis»hizmat ko'rsatish hususiy korxonalari);
- oziq-ovqat sanoati («Chirchiqnon», «Chirchiqdon», «Parrandachilik fabrikasi», «Go'shtni qayta ishslash zavodi» va boshqalar;
- temir yo'llar, tezyurar va avtomobil yo'llari, sug'orish kanallari, shahar suv ta'minoti liniyalari, kanalizasiya va issiqlik tarmoqlari, shuningdek, sanoat korxonalaridan suyuq chiqindilarini olib tashlash uchun keng quvur tarmoqlari [11,12].

Texnogen ta'sirning chiziqli turlari ta'sirining o'ziga xos xususiyati manbaining ikkala tomonidagi sharoitiga qarab o'zgarishi bilan tavsiflanadi. Ularning aksariyati Chirchiq daryosi o'zani bo'ylab cho'zilgan past terassalar uchun xos bo'lgan yer osti jinslarining zichlashishi, grunt va yer osti suvlaringifloslanishini keltirib chiqaradigan geologik muhitga texnogen ob'ektlar ta'siri bilan bog'liq bo'лади.

Xulosa va takliflar. Sanoat hududlarida iflosantiruvchi moddalarining migrasiyasini suvning oqim harakati va xususiyat (gidrodispersiya)lariga bog'liq bo'lgan elementlarning kimyoiviy tarkibi, qismi, ularning migrations darajasi, faolligi har bir holat uchun alohida baholandi, ularning xususiyatlari geokimyoiviy muhitga va turli xil (harorati, oqim tezligi, kislotali va ishqoriy muhit) omillarga qarab sezilarli darajada o'zgarib turadi. Bu sharoitda organik birikmalardan tashqari metallarning miqdori (mis (47,5 mg/l), rux (12,0 mg/l), molibden (20 mg/l) kabi ko'payadi. Suvli qatlamlarning migrations darajasi ifloslanish manbai yaqinida kuzatiladi ($\alpha=0,037$) va bu hududda yuqori ishqoriy muhitning mavjudligi bilan izohlanadi. Yer osti suvlari qatlamida yuqori ishqoriy muhitning deyarli neytralga o'zgarishi va suv tog'-jinsi tizimidagi fizikaviy va kimyoiviy jarayonlar ta'sirida suvli qatlamlarning barqarorlik darajasini oshib borishiga olib keladi. ($\alpha=0,22$). Shu sababli metallarning yer osti suvlari oqimining quiy qismiga past konsentrasiyalarda (0,024 dan 0,015 mg/l gacha) mavjudligi suvli qatlaming migrations darajasi yuqoriligi ($\alpha=0,075 \div 0,22$) bilan izohlanadi[9]. Aerasiya zonasasi jinslari gil tuproq bo'lganda iflosantiruvchi unsurlarini tik mirgasiyasi tezligi 0,05 m/kunni, sog' tuproqlarda 0,20-0,4 m/kunni, qumli giltuproqlarda 1,0m/kungacha, mayda zarrali qumlarda esa 3 metr/kundan 4 m/kungancha tashkil etadi. Yuqoridagilardan ko'rinish turibdiki, iflosantiruvchi unsurlarining aerasiya zonasida vertikal migrasiya tezligi tuproqli jinslarda qumli va dag'al jinslarga nisbatan 7,5 barobardon 10 barobargacha yuqori bo'lishi kuzatiladi. Ishlab chiqarish hamda iqtisodiyotning turli sanoat tarmoqlari qurilishlari rejalashtirilgan xududlarda jinslarning yuqorida keltirilgan xususiyatlariga e'tibor qaratilishi taklif etiladi.

ADABIYOTLAR

1. Abdullaev B.D., Xolmirzaev M.J. Osobennosti izuchenija naxojdeniya imigrasiya cherez zony aerasii nekotorix veshchestv // Materialy Mejdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii «Sovremennoe sostoyanie podzemnyx vod: problemy i ix resheniya» –T.: GP «GIDROINGEO», 2008. №2/1, –S.110–114.
2. Abdullaev B.M., Xolmirzaev M.J. Angren shaxri geoekologik xolatiga ta'sir etuychi texnogen omillar // Materialy Mejdunarodnoj nauchno-tekhnicheskoy konferencii «Sovremennoe sostoyanie podzemnyx vod: problemy i ix resheniya». – T.: GP «GIDROINGEO», 2018. –S.115–118.
3. Bondarev E.N., Nikolaevskiy V.N. Konvektivnaya diffuziya v poristykh sredax s uchetom yavleniya adsorbsii. PMTF – 1962. –№5. –S.127 – 134.
4. Bochever F.M., Lapshin N.N., Oradkovskaya A.E. Zaщита подземных вод от загрязнения. – M: Nedra, 1979. – 254 s.
5. Ber Ya., Zaslavskiy D., Irmey S. Fiziko-matematicheskie osnovy filtrasiy vod. – M: Mir, 1971. – 451 s.
6. Verigin N. N., Vasilev S.V., Kuranov N.P. i dr. Metodы progoza solevogo rejima gruntov i gruntovых vod. -M.: Kolos, 1979. –S 108–336.

7. Goldberg V.M., Gazda S. Gidrogeologicheskie osnovy ohrany podzemnykh vod ot zagryazneniya. – M.: Nedra, 1984. - 260 s.
8. Goldberg V.M., Zverev V.P., Arbuzov A.I i dr. Texnogennoe zagryaznenie prirodnykh vod uglevodorodami i yego ekologicheskie posledstviya. M: Nauka, 2001. –321 s.
9. Yenikeev N.I. Zakonomernosti izmeneniya ximicheskogo sostava podzemnykh vod rechnykh dolin gornoskladchatykh oblastey Uzbekistana v usloviyakh texnogeneza. Avtoref. diss. dokt. geol. miner. nauk. T.:1994.–43s.
10. Samoylenko V.G. Gidrogeologicheskie osnovy ohrany podzemnykh vod ot selskoxozyaystvennogo zagryazneniya // Dis. dokt. geol.-min. nauk.–T.:1982.–351 s.
11. Xolmirzaev M.J. Izucheniya o zakonomernosti migrasii ximicheskix elementov v gornых porodax nekotorykh veshchestv // Vestnik NUUZ, 2013. Spes.vyipusk. – S.138–142.
12. Xolmirzaev M.J. Sanoat hududlarida ifloslantiruvchi unsur (modda) larni migration xususiyatlari (Chirchiq sanoat hududi misoldida). // G.-m. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).Diss.– T.: 2022. –130 b.
13. Lavrik V.I., Rogal I.V., Yakovlenko P.I. Prognozirovaniye kachestva podzemnykh vod pri ix vzaimodeystvii s poverxnostnymi vodami // Tezisy dokladov VII Vsesoyuznogo simpoziuma posovremennym prblemam prognozirovaniya, kontrolya kachestva vody vodoemov –Tallin, 1985.–S.94-96.